

LỖ TRỰC KHUẨN

I. LÂM SÀNG.

- Hội chứng NT-NĐ: Sốt cao, rét run.
- Hội chứng lý: Đau quặn, mót rặn, đại tiện phân nhầy máu

II. XÉT NGHIỆM

- Xét nghiệm phân:
 - + Soi phân: Nhiều hồng cầu, bạch cầu đa nhân trung tính
 - + Cây phân: Shigella (+)
- Công thức máu:
 - + Bạch cầu thường tăng (BCĐNTT tăng)

III. ĐIỀU TRỊ

A. Kháng sinh: Có thể dùng 1 trong những thuốc sau:

1. Cotrimoxazol 480 mg: 4 viên/ngày chia 2 lần x 5 ngày
Với trẻ em: 40 mg/kg/ngày chia 2 lần
2. Cephalosporin thế hệ thứ 3: Ceftriaxon dùng cho phụ nữ có thai và trẻ em < 12 tuổi
 - Người lớn 2g/ngày*2-5 ngày
 - Trẻ em 50-100mg/kg/ngày*2-5 ngày
3. Quinolone (Dùng 1 trong những thuốc sau)
 - Ciprofloxacin 500 mg x 2 lần/ngày*3-5 ngày
 - Pefloxacin 400 mg x 2 lần/ngày*3-5 ngày.
 - Ofloxacin 200 mg x 2 lần/ngày*3-5 ngày

B. Điều trị triệu chứng :

- Bù nước –điện giải
- Hạ sốt