

BỆNH SỐT RÉT

II. Chẩn đoán

1. Dịch tễ học: Tiền sử vào vùng dịch tễ là quan trọng nhất

2. Lâm sàng

- Rét run kéo dài từ 30 phút đến 1 giờ
- Sốt nóng: Kéo dài từ 2-6 giờ
- Vã mồ hôi và hạ nhiệt: BN dễ chịu, khát nước
- Các dấu hiệu khác: Thiếu máu, gan lách to, tiểu cầu giảm
- Các dấu hiệu trong trường hợp nặng: Suy thận, đái máu Hb, RL ý thức.

3. Xét nghiệm

- Tìm KST SR trong máu bằng nhuộm Giem sa
- Test phát hiện KN-KT

III. Điều trị: Chọn 1 trong những thuốc sau:

1. Chloroquin(viên) 250mg

- Người lớn: Ngày 1 uống 4 viên/2 lần cách nhau 6h

N2+N3 uống 1 lần 2 viên

- Trẻ em (Tổng liều 25mg/kg): N1 10mg/kg sau 6h uống tiếp 5mg/kg

N2+N3 5mg/kg uống 1 lần

2. Artemisinin(viên) 250mg

- N1 uống 20mg/kg chia 3 lần cách nhau 8h: Lần 1: 10mg/kg

Lần 2+3: 5mg/kg

- N2-N7: 10mg/kg chia 2 lần cách nhau 8h

3. Artesunat(viên) 50mg

- N1 uống 4mg/kg chia 3 lần cách nhau 8h:Lần 1: 2mg/kg

Lần 2+3: 1mg/kg

- N2-N7:2mg/kg chia 2 lần cách nhau 8h

4.**Aterakine**(*Dihydroartemisinin+Piperaquine*) viên 360mg

- N1: Uống 4 viên chia 2 lần cách nhau 8h

- N2+N3: Uống 1 lần 2 viên

5. **Primaquine**(viên) 13,2mg: *Thuốc được dùng kết hợp với 1 trong 4 thuốc trên*

- Người lớn:2viên/ngày *10 ngày liên tục

- Trẻ em > 2 tuổi:0,5mg/kg *10-14 ngày

*CCĐ:Trẻ em < 2 tuổi,phụ nữ có thai và BN đái huyết cầu tố

IV. Phòng bệnh

- Nằm màn có tẩm Permethrin cả ban ngày trong vùng dịch tễ SR

- Vệ sinh môi trường,phun thuốc diệt muỗi,bọ gậy

- Dùng thuốc chống SR khi đi vào vùng dịch lưu hành

