

# THƯỜNG HÀN

## I. CHẨN ĐOÁN

1. Sốt > 10 ngày, sốt tăng dần, tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc
2. Rối loạn tiêu hóa
3. Bụng chướng, gan lách to, óc ách hố chậu phải (+)
4. Đào ban
5. Dấu hiệu typhos (+)

## II. XÉT NGHIỆM

1. Công thức máu: Bạch cầu giảm, tiểu cầu thường giảm
2. Sinh hóa: Men gan, lactate, LDH tăng.
3. Cây máu: Dương tính 90-95%
4. Phản ứng Widal-Felix, PCR.

## III. ĐIỀU TRỊ

### **1. Kháng sinh: Chọn 1 trong những kháng sinh sau:**

\* Người bệnh > 12 tuổi:

+ Ciprofloxacin 500mg ngày uống 2 viên x 5 -7 ngày

+ Pefloxacin 400mg ngày uống 2 viên x 5 -7 ngày

\* Người bệnh < 12 tuổi + phụ nữ có thai

+ Ceftriaxone 50 – 70 mg/kg/24h x 7 – 10 ngày tiêm TM

+ Cefotaxim: 50 – 70 mg/kg/24h x 7 – 10 ngày tiêm TM

### 2. Điều trị triệu chứng:

- Bù nước-điện giải

- Hạ sốt.

- Nuôi dưỡng TM khi cần.

### 3. Điều trị biến chứng

- Chảy máu tiêu hóa:

- Thủng ruột: Điều trị ngoại khoa

- Viêm cơ tim